



Πρόβατο φυλής Φριζάρτα

Αρνάδες - Νεαροί κριοί

Αρνάδες

Ηλικία απογαλακτισμού	28 - 35 ημερών
Σωματικό βάρος κατά τον απογαλακτισμό	14 - 16 χλγ.
Ηλικία πρώτης γονιμοποίησης	8 - 10 μηνών
Σωματικό βάρος κατά την πρώτη γονιμοποίηση	35 - 40 κιλά
Ποσοστό γονιμοποίησης	85 - 90%
Ηλικία πρώτου τοκετού	13 - 15 μηνών

Νεαροί Κριοί

Ηλικία απογαλακτισμού	28 - 35 ημερών
Σωματικό βάρος κατά τον απογαλακτισμό	18 - 20 χλγ.
Ηλικία έναρξης αναπαραγωγικής δραστηριότητας	9 - 12 μηνών
Σωματικό βάρος κατά την έναρξη αναπαραγωγικής δραστηριότητας	40 - 50 κιλά

*Το ποσοστό αντικατάστασης σε εκτροφές φυλής Φριζάρτα
ανέρχεται σε 20 - 25% ανά παραγωγικό έτος.*



Πρόβατο φυλής Φριζάρτα Κριοί

Ύψος ακρωμίου	75 - 90 εκ.
Σωματικό βάρος	90 - 120 χλγ.
Κληροδοτική τιμή ως προς την γαλακτοπαραγωγή	30 έως 74,5 χγρ.
Ακρίβεια εκτίμησης κληροδοτικής τιμής	49 - 84%
Μέση εμπορεύσιμη γαλακτοπαραγωγή γονέων	280 - 350 χλγ.
Μέγιστη εμπορεύσιμη γαλακτοπαραγωγή γονέων	500 χλγ.

Κληροδοτική τιμή (ΚΤ): εκφράζει τη γενετική ανωτερότητα ενός ζώου σε σχέση με τα υπόλοιπα άτομα του πληθυσμού. Η γενετική αυτή ανωτερότητα κληρονομείται, δηλ. μεταβιβάζεται στους απογόνους. Εάν για παράδειγμα ένας κριός έχει κληροδοτική τιμή ίση με 30 χγρ για τη γαλακτοπαραγωγή, ο μέσος όρος της γαλακτοπαραγωγής των θυγατέρων του θα είναι κατά 15 χγρ υψηλότερος σε σχέση τις θυγατέρες των υπολοίπων κριών.



Πρόβατο φυλής Φριζάρτα

Προβατίνες 1ης Γαλακτικής Περιόδου

Σωματικό βάρος	55 - 60 χλγ.
Ποσοστό γονιμοποίησης	85 - 90%
Δείκτης πολυδυμίας (γεννηθέντα αρνιά ανά τοκετό)	1,5 - 1,7
Περίοδο αναπαραγωγής	Από τα μέσα Αυγούστου μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου
Περίοδο τοκετών	Από τα μέσα Ιανουαρίου μέχρι τα μέσα Απριλίου
Μέση εμπορεύσιμη γαλακτοπαραγωγή	220 - 250 χλγ.
Μέγιστη εμπορεύσιμη γαλακτοπαραγωγή	400 χλγ.
Μέση διάρκεια άλμεξης	150 ημέρες
Μέγιστη διάρκεια άλμεξης	210 ημέρες
Λιποπεριεκτικότητα (%)	6 - 6,6
Πρωτεΐνοπεριεκτικότητα (%)	5,6
Λακτόζη (%)	4,9
Αρ. Σωματικών κυττάρων (μ.ο.χ 1000)	300



Πρόβατο φυλής Φριζάρτα

Προβατίνες 2ης Γαλακτικής Περιόδου

Σωματικό βάρος	65 - 80 χλγ.
Ποσοστό γονιμοποίησης	93 - 97%
Δείκτης πολυδυμίας (γεννηθέντα αρνιά ανά τοκετό)	1,6 - 1,8
Περίοδο αναπαραγωγής	Από τα μέσα Απριλίου μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου
Περίοδο τοκετών	Από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα Απριλίου
Μέση εμπορεύσιμη γαλακτοπαραγωγή	280 - 350 χλγ.
Μέγιστη εμπορεύσιμη γαλακτοπαραγωγή	500 χλγ.
Λιποπεριεκτικότητα (%)	6 - 6,6
Πρωτεϊνοπεριεκτικότητα (%)	5,6
Λακτόζη (%)	4,9
Αρ. Σωματικών κυττάρων (μ.ο.χ 1000)	300